

QUÈ ÉS LA TRIQUINOSI?

La triquinosi és una malaltia parasitària àmpliament difosa a nivell mundial que es transmet pels aliments i per a la qual existeixen mesures específiques de control a la normativa de la UE.

QUINS SÓN ELS SÍMPTOMES DE LA TRIQUINOSI?

La malaltia consta d'una primera fase gastrointestinal i d'una segona fase sistèmica.

Síntomes gastrointestinals:

vòmits, diarrea, nàusees i calfreds abdominals.

Síntomes sistèmics:

dolor muscular i febre.

El procés es pot complicar amb quadres neurològics i cardíacs.

QUINS SÓN ELS ALIMENTS QUE PODEN TRANSMETRE LA MALALTIA?

> Carn crua o carn poc cuinada de porcs, porcs senglars i cavalls.

> Embotits no sotmesos a tractament tèrmic (sobrassada, llonganissa, carn i xulla...).

IMPORTANT: S'han de consumir carn i embotits casolans de porcs procedents de matances tradicionals o de porcs senglars de caça que s'hagin sotmès a l'anàlisi de triquina. És per a la seguretat de tots.

QUINS SÓN ELS COMPROMISOS DE LA CONSELLERIA DE SALUT CONSUM PER AL CONTROL DE LA TRIQUINOSI?

> Establir mesures perquè els porcins sacrificats destinats al consum domèstic privat se sotmeten a l'anàlisi de triquina i que no es consumeixen productes de risc fins a l'obtenció del resultat favorable de l'anàlisi.

> Controlar que la carn que surt dels escorxadors de les Illes Balears s'ha sotmès a l'anàlisi de detecció de triquina i el resultat ha estat negatiu.

> Controlar que la carn que es comercialitza a la nostra comunitat autònoma procedeixi d'establiments autoritzats.

Per a qualsevol dubte, queixa o suggeriment podeu contactar amb nosaltres mitjançant la pàgina web lasalutentot.caib.es on també podeu trobar informació útil.

QUINES SÓN LES MESURES DE CONTROL SANITARI DEL SACRIFICI DELS PORCS DESTINATS AL CONSUM DOMÈSTIC PRIVAT?

Les mesures de control establerts a la normativa autonòmica es basen en quatre punts:

- 1. Intervenció dels ajuntaments** a l'organització i l'aprovació de la campanya de sacrifici dels porcs destinats al consum domèstic privat.
- 2. Sotmetre la carn a l'anàlisi** de detecció de triquina.
- 3. Realització de les analítiques** de detecció de triquina pels veterinaris col·laboradors.
- 4. Supervisió del funcionament del sistema** per part de la Direcció General de Salut Pública i Participació.

IMPORTANT: La seguretat alimentària comença a la producció primària. És responsabilitat de tots aconseguir un elevat nivell de protecció de la salut.

QUINES SÓN LES PASSES PERDUR A TERME L'ANALÍTICA?

> Posar-se en contacte amb l'ajuntament respectiu perquè ens informin dels veterinaris col·laboradors designats.

> Prendre dues mostres per cada pilar del diafragma de la zona de transició entre la part muscular i la part tendinosa (per a qualsevol dubte o aclariment posar-se en contacte amb el veterinari col·laborador designat per l'ajuntament).

> Lliurar la mostra al veterinari col·laborador en l'horari designat a tal efecte: quan es lliurin les mostres, a més, es proporcionarà informació de l'origen del porc (identificació de l'explotació, localització, municipi...) i dades personals de qui lliura la mostra (nom i llinatges, DNI, adreça i número de telèfon de contacte).

IMPORTANT: No consumir carn crua ni embotits no sotmesos a tractament tèrmic abans de l'obtenció del resultat analític.

LES MATANCES I LA TRIQUINOSI



lasalutentot.caib.es

LES MATANCES I LA TRIQUINOSI
RESPONSABILITATS I PERILLS SANITARIS